

- 1) **Respuesta correcta: A.** No hay interferencia entre una vacuna viva (trivírica) y otra inactivada (influenza)

- 2) **Respuesta correcta: D.** Debe vacunarse, pero se recomienda consultar en servicio de alergia para evaluar pre medicación y que lo haga en un ambiente controlado con acceso a manejo de reacciones alérgicas y con observación por unos 30 minutos (las reacciones anafilácticas suelen ser ocurrir en este lapso).

- 3) **Respuesta correcta: C.** El virus suele circular por varias semanas y suelen haber brotes diferentes de distintos virus influenza.

- 4) **Respuesta correcta: A.** La vacuna es inactivada por lo que biológicamente es incapaz de producir enfermedad la vacuna contiene sólo fragmentos del virus, subunidades purificadas o virosomas, todas ellas son composiciones sin virus vivo ni material genético viral con posibilidad de replicación en el vacunado.

- 5) **Respuesta correcta: D.** Las embarazadas deben recibir la vacuna de Influenza en cualquier trimestre del embarazo durante la temporada de influenza que es determinada por las autoridades de salud pública de cada país.

- 6) **Respuesta correcta: A.** El embarazo a cualquier edad y en cualquier trimestre es un factor de riesgo para formas graves o complicaciones de influenza.

- 7) **Respuesta correcta: C.** En las evaluaciones realizadas no se demostró interferencia en la inmunogenicidad de las diferentes vacunas administradas, independientemente del intervalo entre ellas.

- 8) **Respuesta correcta: D.** Se puede indicar dos dosis de vacuna monovalente con intervalo de 4 semanas entre ambas dosis y completarlo antes de los 6 meses de edad.

- 9) **Respuesta correcta: C.** La inmunodeficiencia severa combinada contraindica la aplicación de la vacuna de rotavirus.

- 10) **Respuesta correcta: D.** El bebé ya tiene una edad mayor al límite de edad recomendada para administrar la primera dosis de vacuna para rotavirus.